

VACUNA COMIRNATY® PFIZER

CONTRAINDICACIONES

- Personas con antecedentes de reacción alérgica grave (anafilaxia) a cualquier componente de la vacuna.
- Personas con reacción alérgica inmediata de cualquier gravedad a cualquier componente de la vacuna o a una dosis previa de la vacuna.
- Haber recibido otra vacuna en los últimos 14 días. **NOTA:** No podrá recibir ninguna vacuna en los 14 días posteriores a la administración de esta vacuna.
- Enfermedad febril aguda.
- Embarazo: No hay evidencia suficiente para recomendar su uso durante el embarazo. En términos generales, debe posponerse la vacunación de embarazadas hasta el final de la gestación. En embarazadas con alto riesgo de exposición y/o complicaciones valorar el balance riesgo/beneficio. **
- Lactancia: No hay datos sobre los posibles efectos de la vacuna durante la lactancia, ni sobre la producción de leche ni sobre el lactante. **

** Consultar con su especialista.

Excipientes incluidos:

- Polietilenglicol / macrogol (PEG) como parte de ALC-0159.
- ALC-0315 = (4-hidroxibutil) azanediil) bis (hexano-6,1-dil) bis (2-hexildecanoato)
- ALC-0159 = 2 - [(polietilenglicol) -2000] -N, N ditetradecilacetamida
- 1,2-Distearoil-sn-glicero-3-fosfolina
- Colesterol
- Cloruro de potasio
- Dihidrógeno fosfato de potasio
- Cloruro de sodio
- Hidrogenofosfato disódico
- Sacarosa
- Agua para preparaciones inyectables

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1201528001/FT_1201528001.pdf