



Protocolo de recomendaciones para pacientes con complicaciones posteriores a los tratamientos de Cirugía Oral e Implantología

Objetivo: proporcionar una guía de recomendaciones y pasos a seguir para pacientes que presenten complicaciones tras una intervención quirúrgica oral.

1. Sangrado excesivo:

- Comprima o muerda con firmeza una gasa estéril o un pañuelo limpio sobre el área afectada durante 20-30 minutos.
- Evite enjuagar, escupir o usar pajitas, ya que esto puede estimular el sangrado.
- Si el sangrado continúa, comuníquese con nuestra clínica dental inmediatamente o el servicio de urgencias de su centro de salud u hospital más cercano.

2. Inflamación excesiva:

- Aplique una bolsa de hielo envuelta en un paño en el exterior de la cara sobre el área afectada, durante 20 minutos y descanse 20 minutos. Repita según sea necesario durante las primeras 24 horas.
- Si la inflamación persiste o aumenta después de 48 horas, comuníquese con nuestra clínica dental inmediatamente o el servicio de urgencias de su centro de salud u hospital más cercano.

3. Dolor intenso:

- Asegúrese de estar tomando el medicamento para el dolor según las indicaciones de su odontólogo.
- Si el dolor es insoportable o no se alivia con los analgésicos prescritos, comuníquese con nuestra clínica dental inmediatamente o el servicio de urgencias de su centro de salud u hospital más cercano.

4. Fiebre:

- Una fiebre leve puede ser una reacción normal después de la cirugía.
- Si presenta fiebre alta o persistente, comuníquese con nuestra clínica dental inmediatamente o el servicio de urgencias de su centro de salud u hospital más cercano, ya que podría ser signo de infección.

5. Suturas sueltas o caídas:

- No se alarme si alguna sutura se cae o se deshace antes de la cita de seguimiento.
- Si está preocupado, presenta sangrado o siente que el área no está cerrando adecuadamente, comuníquese con nuestra clínica dental inmediatamente.

6. Sabor u olor desagradable:

- Mantenga una buena higiene oral y enjuáguese con solución salina o los antisépticos indicados por su odontólogo.
- Si está preocupado o el problema persiste, comuníquese con su clínica dental.

7. Persistencia de sensación de anestesia:

- Puede tratarse de una consecuencia de la inflamación. No se alarme.
- Si experimenta este síntoma, comuníquese inmediatamente con nuestra clínica dental.

8. Dificultad para abrir la boca, tragar o respirar:

- Si la dificultad es importante, persistente o empeora, comuníquese con nuestra clínica dental inmediatamente o el servicio de urgencias de su centro de salud u hospital más cercano.

Recomendación general: siempre siga las indicaciones post-operatorias proporcionadas por su odontólogo y no dude en comunicarse con nuestra clínica dental o su centro de salud/ servicio de urgencias ante cualquier signo de complicación. Es crucial actuar rápidamente para evitar problemas mayores.